桃 Peach

離核水蜜

品種名：離核水蜜
來源：日本岡山縣御津郡的石谷於1980年發表,為'上海水蜜'的實生種
樹姿：開張
樹勢：中等
開花期：4月上旬
成熟期：7月下旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：深綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：深粉紅色
果型：圓形
縫合線：淺,明顯
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：對稱
果皮顏色：紅色
表皮絨毛：細短較密
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：乳白色,近核處紅色
果肉質地：鬆軟,纖維粗多,為溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：220
可溶性固形物 (°Brix)：11.3
可滴定酸(%)：0.73
產量：豐產
核顏色：紅褐色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

品種名：錦A
來源：日本
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：3月上旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：橢圓形

縫合線：明顯
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：不對稱
果皮顏色：紅色
表皮絨毛：長,多
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：淺黃色
果肉質地：非溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：208.1
可溶性固形物 (°Brix)：9.7
可滴定酸(%)：0.44
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：加工

錦B

品種名：錦B
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月上旬
成熟期：7月上旬
葉型：卵圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：近圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凸
對稱性：對稱
果皮顏色：橘紅色
表皮絨毛：中等
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：淺黃色
果肉質地：細,多汁
果肉與核之粘離：半離核
平均果重 (g)：195
可溶性固形物 (˚Brix)：9.5
可滴定酸(%)：0.39
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：加工

土用

品種名：土用
來源：日本岡山縣小田郡長尾園澄於1897年從上海水蜜桃實生苗選出
樹姿：開張
樹勢：強健
開花期：3月上旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色

果型：橢圓形或卵圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凸
對稱性：對稱
果皮顏色：黃色
表皮絨毛：短而密生
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：黃肉
果肉質地：細,纖維少,汁多
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：265.1
可溶性固形物 (°Brix)：9
可滴定酸(%)：0.40
產量：豐產
核顏色：紅褐色
核形狀：橢圓形
用途：加工

夕空

品種名：夕空
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：卵圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：短突尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：淺粉紅色
果型：近圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：對稱
果皮顏色：底色乳白,著紅暈,白色細點
表皮絨毛：中粗
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白肉,近核帶紅色
果肉質地：細,汁液多,纖維少,溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：155.5
可溶性固形物 (˚Brix)：11.4
可滴定酸(%)：0.30
產量：中等
核顏色：紅色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

大久保

品種名：大久保
來源：原產日本,1920岡山縣赤盤郡熊山町白桃園中發現的實生後代
樹姿：開張
樹勢：中等
開花期：3月中旬
成熟期：7月中旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：深綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：淺粉紅色
果型：近圓形或橢圓形
縫合線：淺,較明顯
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：不對稱
果皮顏色：乳白色,著紅色斑紋
表皮絨毛：短密
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：乳白色,近核處帶玫瑰紅色
果肉質地：肉質稍粗,汁多纖維中等,溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：250
可溶性固形物 (˚Brix)：12
可滴定酸(%)：0.56
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食,加工

桃 *Peach*

長野早生

品種名：長野早生
來源：日本
樹姿：半開張
樹勢：中等
開花期：3月中旬
成熟期：6月中下旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：近圓形

縫合線：淺,不明顯
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：底色白,全面著紅暈及紅色條斑
表皮絨毛：短,多
皮剝離難易：皮不易剝離
果肉顏色：全白肉
果肉質地：細,纖維少
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：192.2
可溶性固形物 (˚Brix)：12.4
可滴定酸(%)：0.21
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

倉方早生

品種名：倉方早生
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強健
開花期：3月中旬
成熟期：6月下旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：深綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：廣楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：對稱
果皮顏色：底色乳白,著紅暈
表皮絨毛：短,中等
皮剝離難易：熟果易剝離
果肉顏色：全白肉
果肉質地：細,纖維少
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：180.8
可溶性固形物 (˚Brix)：11.6
可滴定酸(%)：0.21
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：橢圓形
用途：鮮食

大和早生

品種名：大和早生
來源：日本奈良縣几城郡川東村的森川嘉造選自大和白桃的枝變
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月上旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：深綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：淺粉紅色
果型：近圓形
縫合線：明顯
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：不對稱
果皮顏色：乳白色,頂端紅暈
表皮絨毛：細,短
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白色,近核處帶紅色
果肉質地：柔軟細密,纖維少,多汁
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：185
可溶性固形物 (˚Brix)：10.5
可滴定酸(%)：0.19
產量：豐產
核顏色：淺紅色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

小平早生

品種名：小平早生
來源：日本
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：6月下旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：淺粉紅色
果型：近圓形
縫合線：明顯
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：對稱
果皮顏色：白色,帶紅色條紋
表皮絨毛：中等
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白肉近核處帶少量紅色
果肉質地：細密多汁,纖維少
果肉與核之粘離：半離核
平均果重 (g)：226.4
可溶性固形物 (˚Brix)：11.6
可滴定酸(%)：0.31
產量：中等
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

桃 Peach

布目早生

品種名：布目早生
來源：原產日本,為愛知縣的布目清在1937年於白桃,離核,大久保,及岡山早生混植園中採集種子實生選拔
樹姿：開張
樹勢：強健
開花期：4月上旬
成熟期：6月中下旬
葉型：卵圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形

花型：薔薇形
花色：淺粉紅色
果型：橢圓或近圓形
縫合線：淺,兩側對稱
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：乳白色
表皮絨毛：較稀
皮剝離難易：熟果易剝皮
果肉顏色：白色近頂微紅
果肉質地：細軟,纖維中等
果肉與核之粘離：離核或半
平均果重 (g)：185
可溶性固形物 (˚Brix)：10
可滴定酸(%)：0.27
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食,加工



品種名：松森早生
來源：日本，松森美富氏於白鳳實生苗中發現
樹姿：直立
樹勢：強
開花期：3月上中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：白色,分布紅暈較多
表皮絨毛：短,細
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白色,近核處微紅
果肉質地：細密,纖維少,為硬溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：163.2
可溶性固形物 (˚Brix)：11
可滴定酸(%)：0.14
產量：豐產
核顏色：淺木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

桃 Peach

砂子早生

品種名：砂子早生
來源：原產日本,自實生苗選出
樹姿：開張
樹勢：強健
開花期：3月上旬
成熟期：6月下旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：近圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓平
對稱性：較對稱
果皮顏色：乳白色,頂部易著色有紅色條斑
表皮絨毛：稀
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：乳白色,頂部帶少量紅絲近核處與肉色相
果肉質地：細密,纖維少,汁液中等
果肉與核之粘離：半離核
平均果重 (g)：241.5
可溶性固形物 (°Brix)：11.4
可滴定酸(%)：0.30
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

櫛形白桃

品種名：櫛形白桃
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月上旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：深綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：近圓形

縫合線：中深
果頂形狀：圓平
對稱性：不對稱
果皮顏色：底色白,具紅色條斑
表皮絨毛：粗,中等
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白色
果肉質地：細軟,多汁
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：157.6
可溶性固形物 (˚Brix)：10.2
可滴定酸(%)：0.15
產量：中等
核顏色：淺褐色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

德安白桃

品種名：德安白桃
來源：大陸
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：對稱
果皮顏色：玫瑰紅,有紅色條斑
表皮絨毛：中長
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：乳白色
果肉質地：鬆軟,多汁
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：215
可溶性固形物 (˚Brix)：10.4
可滴定酸(%)：0.45
產量：豐產
核顏色：褐色
核形狀：倒卵形
用途：鮮食

入江白桃

品種名：入江白桃
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月上旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：淡粉紅色
果型：圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓凸
對稱性：對稱
果皮顏色：底色淡黃,著紅暈
表皮絨毛：中等
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白色,近核處帶紅色
果肉質地：細,纖維中粗,多汁
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：182.9
可溶性固形物 (°Brix)：12.6
可滴定酸(%)：0.23
產量：中等
核顏色：淺褐色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

大和白桃

品種名：大和白桃
來源：原產日本,由白桃跟Carmen雜交育成
樹姿：開張
樹勢：強健
開花期：3月上旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形或圓形
花型：薔薇形
花色：淺粉紅色
果型：近圓形

縫合線：明顯
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：乳白色,紅色斑點和條紋
表皮絨毛：短,細
皮剝離難易：熟果易剝皮
果肉顏色：白色
果肉質地：鬆軟,纖維少汁多
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：450
可溶性固形物 (°Brix)：11.8
可滴定酸(%)：0.25
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：橢圓形
用途：鮮食

淺間白桃

品種名：淺間白桃
來源：原產日本,為山梨縣前島傳次郎在高陽白桃上發現的枝變品種
樹姿：開張
樹勢：強健
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：卵圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：淺粉紅色
果型：近圓形
縫合線：中深
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：對稱
果皮顏色：乳白色,著紅暈
表皮絨毛：密,多
皮剝離難易：熟果可剝皮
果肉顏色：乳白色,近核處肉色微紅
果肉質地：細密,纖維較少,汁液多
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：239
可溶性固形物 (˚Brix)：12.1
可滴定酸(%)：0.17
產量：中等
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵形
用途：鮮食

勘助白桃

品種名：勘助白桃
來源：日本
樹姿：半開張
樹勢：中庸
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：近圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓平
對稱性：不對稱
果皮顏色：底色白,著紅暈
表皮絨毛：細毛
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：乳白色
果肉質地：汁液多,纖維細少,溶質
果肉與核之粘離：半離核
平均果重 (g)：152.3
可溶性固形物 (°Brix)：12.8
可滴定酸(%)：0.21
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

愛知白桃

品種名：愛知白桃
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：短突尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：淺粉紅色
果型：圓形

縫合線：淺,明顯
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：對稱
果皮顏色：底色淺黃,帶紅色斑
表皮絨毛：中粗
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白色,近核處微粉紅色
果肉質地：汁液多,纖維中粗,溶質
果肉與核之粘離：半離核
平均果重 (g)：225
可溶性固形物 (°Brix)：12.2
可滴定酸(%)：0.15
產量：豐產
核顏色：紅褐色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

#桃 Peach

山根白桃

品種名：山根白桃
來源：日本岡山梨縣的山根於實生苗中偶然發現
樹姿：開張
樹勢：中庸
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：圓形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓,略扁

縫合線：中深
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：不對稱
果皮顏色：乳白色,著玫瑰色細點條紋和暈
表皮絨毛：中粗
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：乳白色,近核處紅色
果肉質地：細密,纖維細少,汁多軟溶至硬溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：250
可溶性固形物 (˚Brix)：11.4
可滴定酸(%)：0.35
產量：豐產
核顏色：紅褐色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

鈴木白桃

品種名：鈴木白桃
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：6月下旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：深綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：近圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：不對稱
果皮顏色：乳白色,著玫瑰紅暈
表皮絨毛：短,細
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白色
果肉質地：肉質細,纖維細少
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：211.2
可溶性固形物 (˚Brix)：12.3
可滴定酸(%)：0.27
產量：中等
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵形
用途：鮮食

西野白桃



品種名：西野白桃
來源：日本山梨縣巨摩郡的芦澤達雄由大久保和白桃的混植園中所選出的自然實生種
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月上旬
成熟期：7月中旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面深紅色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：淺粉紅色
果型：近圓形
縫合線：頂較深,腹部較淺基部圓平
果頂形狀：圓凸
對稱性：對稱
果皮顏色：乳黃色,頂腹部呈紅暈
表皮絨毛：細,短
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：乳黃色,腹部呈粉紅色,近核處帶紅
果肉質地：細密,纖維多,粗長,汁多,軟溶至硬溶
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：223.6
可溶性固形物 (˚Brix)：15.3
可滴定酸(%)：0.3
產量：豐產
核顏色：木黃色帶紅色
核形狀：倒卵形
用途：鮮食

志賀白桃

品種名：志賀白桃
來源：日本
樹姿：半開張
樹勢：中庸
開花期：3月中旬
成熟期：7月中旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅棕色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：楔形
腺體：圓形或腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：近圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凸
對稱性：不對稱
果皮顏色：底色乳白,
表皮絨毛：長
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：乳白色,近核處微帶紅色
果肉質地：纖維中粗,溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：182.5
可溶性固形物 (˚Brix)：8
可滴定酸(%)：0.23
產量：中等
核顏色：紅褐色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食



岡山白桃

品種名：岡山白桃
來源：日本岡山縣赤盤郡熊山町的大久保重五郎於1899年在桃園中發現的自然實生種
樹姿：開張
樹勢：強健
開花期：3月中下旬
成熟期：7月中旬
葉型：披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面深紅色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：淺粉紅色
果型：近圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：不對稱
果皮顏色：底色乳黃稍綠,頂及腹部著少量淡紅暈
表皮絨毛：少,中粗
皮剝離難易：皮厚,完熟後易剝離
果肉顏色：白色,近核處著大量紅色
果肉質地：細密多汁,硬溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：200.6
可溶性固形物 (°Brix)：11.2
可滴定酸(%)：0.1
產量：中等
核顏色：紅褐色
核形狀：橢圓形
用途：鮮食,加工

中津白桃

品種名：中津白桃
來源：1940年,日本人中津正之由自家果園白桃種子實生選出
樹姿：半開張
樹勢：強健
開花期：3月中旬
成熟期：7月下旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：深綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：近圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：稍不對稱
果皮顏色：底色乳白色,頂腹部呈紅暈
表皮絨毛：短
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白肉
果肉質地：細密多汁,纖維中等,溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：258.8
可溶性固形物 (˚Brix)：13
可滴定酸(%)：0.24
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食